

## Листок-вкладыш: Информация для пациента

### Лиотон® 1000 МЕ/г гель

Гепарина натриевая соль

**Перед началом применения данного лекарственного препарата внимательно прочтите весь листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важная для Вас информация.**

Данный препарат следует использовать строго в соответствии с указаниями, изложенными в данном листке-вкладыше, или в соответствии с назначениями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам понадобится прочесть его снова.
- Если Вам нужна дополнительная информация или совет, проконсультируйтесь у работника аптеки.
- При появлении каких-либо побочных действий обратитесь к врачу или работнику аптеки. Это касается любых возможных побочных действий - в том числе и тех, которые не описаны в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.
- Если по истечении 7 дней симптомы усугубились или улучшение не наступило, обратитесь к врачу.

### Содержание данного листка-вкладыша

1. Что представляет собой Лиотон® 1000 МЕ/г гель и для чего он используется
2. Что нужно знать перед использованием препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель
3. Как использовать Лиотон® 1000 МЕ/г гель
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить Лиотон® 1000 МЕ/г гель
6. Содержимое упаковки и прочая информация

### 1. Что представляет собой Лиотон® 1000 МЕ/г гель и для чего он используется

Действующим веществом препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель является гепарин (гепарина натриевая соль). Лиотон выпускается в виде геля, предназначенного для нанесения на кожу. При нанесении на пораженные участки гепарин предотвращает образование тромбов в поверхностных венах, улучшает местную микроциркуляцию и уменьшает отечность.

Лиотон® 1000 МЕ/г гель используется для:

- симптоматического лечения при заболеваниях поверхностных вен (такие, например, заболевания, для которых характерно варикозное расширение вен и их осложнения, образование тромбов в пораженных венах с воспалением или без воспаления стенки вен, а также язвы, появляющиеся на коже в области варикозно расширенных вен);
- лечения при воспалении стенки вены, пораженной вследствие оперативных вмешательств;
- уменьшения выраженности явлений, имеющих место после оперативных вмешательств, проведенных на венах (например, синяки и отеки);
- устранения отеков и синяков в области суставов и мышц после их травм и растяжений.

Лиотон® 1000 МЕ/г гель можно использовать в качестве отдельно взятого - при наличии показаний к местному лечению - или же в комбинации с системной терапией (она оказывает влияние на весь организм).

## **2. Что нужно знать перед использованием препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель**

### **Лиотон® 1000 МЕ/г гель использовать нельзя**

- при наличии аллергии на гепарина натриевую соль или любые другие компоненты данного лекарственного средства (перечислены в разделе 6).

### **Предупреждения и меры предосторожности**

- Если у Вас имеется повышенная склонность к кровотечениям. В этом случае Вашему врачу необходимо тщательно взвесить возможность применения препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель;
- Если у Вас после использования препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель появляются признаки аллергии. В этом случае использование препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель должно быть немедленно прекращено;
- Если у Вас в области, где должен наноситься препарат, есть открытые раны, кровотечения на коже или же имеет место кожная инфекция: Лиотон® 1000 МЕ/г гель на такие места наносить нельзя. Лиотон® 1000 МЕ/г гель также не следует использовать на участках, не покрытых кожей (например, половые органы, рот). (См. также раздел «Лиотон® 1000 МЕ/г гель использовать нельзя»).

Перед использованием препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель обратитесь за консультацией к врачу или работнику аптеки:

#### Дети и подростки

Лиотон® 1000 МЕ/г гель не следует использовать у детей и подростков, поскольку безопасность и эффективность препарата в этой возрастной группе не выяснена.

#### **Другие лекарственные средства и Лиотон® 1000 МЕ/г гель**

Соблюдайте особую осторожность, если Вы принимаете пероральные антикоагулянты (т. е. лекарства для профилактики образования тромбов). В этих случаях нанесение гепарина на кожу может способствовать удлинению времени свертывания крови.

Если Вы в настоящее время принимаете, принимали в недавнем прошлом или могли принимать любые другие лекарственные средства, сообщите об этом врачу или работнику аптеки.

#### **Беременность, грудное вскармливание и детородная функция**

Данные по использованию препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель в период беременности или лактации отсутствуют.

В случае беременности или кормления грудью, а также при наличии возможной или планируемой беременности перед приемом данного препарата обращайтесь за консультацией к врачу или работнику аптеки.

#### **Влияние на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов**

Лиотон® 1000 МЕ/г гель не оказывает влияния на Вашу способность управлять автомобилем и обслуживать механизмы.

**В препарате Лиотон® 1000 МЕ/г гель содержатся метил-*п*-гидроксибензоат и пропил-*п*-гидроксибензоат, которые могут вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).**

## **3. Как использовать Лиотон® 1000 МЕ/г гель**

Данный препарат следует использовать строго в соответствии с указаниями, изложенными в данном листке-вкладыше, или в соответствии с назначениями лечащего врача или работника аптеки. Если у Вас имеются сомнения, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### Дозировка и способ применения

Лиотон® 1000 МЕ/г гель предназначен для использования на неповрежденной коже. Наносить гель (из тюбика выдавливается полоска геля длиной 3 - 10 сантиметров) на пораженный участок от одного до трех раз в сутки и втирать массажными движениями. Если симптомы, наблюдаемые у Вас, усугубились или же по истечении 7 дней улучшение не наступило, обратитесь к врачу.

#### **Если Вы нанесли большее количество препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель, чем следовало**

О случаях передозировки препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель сообщений не поступало.

**Если Вы забыли нанести Лиотон® 1000 МЕ/г гель**, нанесите его, как только об этом вспомните. Не используйте двойную дозу для компенсации пропущенной.

Если у Вас появятся дальнейшие вопросы по применению данного препарата, обратитесь к своему врачу или работнику аптеки.

#### **4. Возможные побочные действия**

Как и все лекарственные средства, данный препарат может вызывать побочные действия, хотя они возникают не у всех.

Аллергические реакции на гепарин после его нанесения на кожу наблюдаются очень редко («очень редко» означает, что они встречаются менее, чем у 1 из 10000 пациентов).

В единичных случаях (частота не известна: по имеющимся данным оценке не поддается) могут развиваться реакции повышенной чувствительности - такие, как покраснение кожи и зуд. Эти реакции, обычно, исчезают вскоре после отмены препарата.

#### **Сообщение о побочных действиях**

При появлении каких-либо побочных действий обратитесь к врачу или работнику аптеки. Это касается любых возможных побочных действий - в том числе и тех, которые не описаны в данном листке-вкладыше. Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь собрать больше информации о безопасности данного лекарственного препарата.

#### **5. Как хранить Лиотон® 1000 МЕ/г гель**

Хранить в недоступном для детей месте.

Данный лекарственный препарат не требует особых условий хранения.

По истечению срока годности, указанного на картонной упаковке и тубе, данное лекарственное средство больше не используйте. Датой окончания срока годности является последний день указанного месяца.

После первого вскрытия упаковки Лиотон 1000 МЕ/г гель можно использовать в течение 6 месяцев.

Не выбрасывайте никакие лекарственные препараты в канализацию или с бытовым мусором. Проконсультируйтесь с работником аптеки в отношении того, как утилизировать ненужный лекарственный препарат. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

## **6. Содержимое упаковки и прочая информация**

### **Что содержится в препарате Лиотон® 1000 МЕ/г гель**

- Действующим веществом является гепарина натриевая соль: 1000 МЕ (международных единиц) на 1 г геля.
- Прочие компоненты: карбомер 940, метил-л-гидроксibenзоат, пропил-л-гидроксibenзоат, спирт этиловый, масло цветов померанца (масло неролиевое), масло лавандовое, триэтаноламин, вода очищенная.

### **Внешний вид препарата Лиотон® 1000 МЕ/г гель и содержимое упаковки**

Лиотон® 1000 МЕ/г гель - это гель для нанесения на кожу.

Лиотон® 1000 МЕ/г гель представляет собой почти прозрачный гель, бесцветный или слегка желтоватого цвета, вязкой консистенции, с ароматным запахом.

Лекарственное средство выпускается в тубах по 30 г, 50 г и 100 г геля. В продаже могут иметься упаковки не всех размеров.

### **Владелец регистрационного удостоверения**

А. Менарини Индустриэ Фармачеутикэ Риунитэ с.р.л. (Менарини Групп), Виа Сеттэ Санти 3, 50131 Флоренция, Италия

### **Производитель**

А. Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз с.р.л., Виа Сеттэ Санти 3, 50131 Флоренция, Италия

**Дата последней редакции данного листка-вкладыша: 02.2016 г.**